

Acr-Bis(40%, 37.51)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

丙烯酸胺:亚甲基双丙烯酸胺溶液又称 Acr-Bis，最常用的是 30%Acr-Bis(29:1)即为含 30% Acrylamide-Bisacrylamide 的水溶液，其中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 29:1，丙烯酸胺的总比例为 30%。

Acr-Bis(40%,37.5:1)中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 37.5:1，丙烯酸胺总量为 40%，常用于配制丙烯酸胺凝胶(PAGE 胶)，如 SDS-PAGE 胶等，可以用于蛋白或核酸的分离。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
Acr-Bis(40%,37.5:1)	500ml	4℃ 避光	1 份	6 个月

操作步骤(仅供参考)：

1、因具体实验而异，可以参考 SDS-PAGE 凝胶配制的说明。

注意事项：

- 1、Acr-Bis(40%,37.5:1)对人体有一定神经毒性，请注意适当防护。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

一步法凝胶制备试剂盒(15%)
一步法凝胶制备试剂盒(6%)
一步法凝胶制备试剂盒(8%)
乙酸凝胶缓冲液(4×)